



## MIRTILLO

### COMPONENTI:

- Tavolette: Mirtillo bacche 75%.
- Estratto analcolico: Mirtillo bacche 50%.

INDICAZIONI: diarrea, dispepsia cronica fermentativa, dispepsia del lattante, coadiuvante nella terapia del diabete (foglie), turbe della circolazione, cellulite.

### PROPRIETA':

- Il frutto, contenente tannini ed acidi organici, è dotato di un'azione tonica ed astringente che ne consente l'uso in diverse forme di diarrea o dissenteria. Le bacche presentano inoltre proprietà antisettiche utili nel trattamento delle infezioni intestinali.
- Gli antocianosidi, di cui sono ricche, esplicano azione elettiva sui capillari, di cui aumentano la resistenza e diminuiscono la permeabilità.
- È dotato di un'azione protettiva ed antiemorragica microvascolare, esplica in particolare un'azione vasocostrittiva sull'apparato oculare, favorendo la percezione visiva in condizioni di scarsa illuminazione.

MODALITA' D'USO GOCCE: 30 gocce 3 volte al dì

TAVOLETTE: 1-3 tavolette durante i pasti.

CONFEZIONE: 2 blister da 25 tavolette o estratto analcolico 50 ml.

### ASSOCIAZIONI:

- Coadiuvante nella terapia del diabete (foglie) con GLUCOTIN.
- Dispepsia cronica fermentativa.  
con AERMIT – SGONFY (lattante).
- Diarrea (foglie o frutti essiccati) con ACIDOPHILUS.
- Coliti diarroiche con COLICOMP.
- Microcircolazione con ELICAP – GINKGO BILOBA – LUCY.

### CONTROINDICAZIONI:

- Ipersensibilità verso i singoli componenti.